



Если у вашего друга наблюдаются приведенные ниже симптомы, возможно, у него передозировка.

- Он не просыпается.
- Не дышит каждые 3–5 секунд.
- Кожа имеет синеватый, серый или фиолетовый оттенок, либо холодная на ощупь.

Если вам кажется, что у вашего друга передозировка, дайте ему налоксон (Narcan) и позвоните по номеру 911.

На территории штата Вашингтон действуют положения Good Samaritan (Закон доброго самаритянина), защищающие спасателя и пострадавшего от преследования за хранение наркотиков.

Как пользоваться налоксоном

Сначала переведите человека в положение лежа.

1. Откройте упаковку

Не брызгайте, чтобы проверить.
Спрей рассчитан на одну дозу.

2. Держите баллончик вот так

3. Вставьте наконечник спрея в любую ноздрю

Ваши пальцы должны
касаться носа.

4. Нажмите на поршень до упора.



Затем сделайте искусственное дыхание. Если человек не пришел в сознание в течение 2–3 минут, дайте еще одну дозу налоксона.

Продолжайте делать искусственное дыхание и давать налоксон, пока человек не придет в сознание или пока не прибудет помощь.



Чтобы узнать больше,
посетите сайт:
WAFriendsForLife.com

Washington State
Health Care Authority