



**Todos
merecemos vivir,
y todos podemos
ser un amigo
de por vida.**

**MANTEN
SEGUROS A
TUS AMIGOS.
PORTA
NALOXONA
(NARCAN).**



Ve más información en
WAFriendsForLife.com/es/obten-naloxona

Washington State
Health Care Authority

**La mayoría de las muertes por
sobredosis en Washington
involucran fentanilo.**

**La naloxona revierte las
sobredosis de opioides,
incluso de fentanilo.**

DATOS SOBRE EL FENTANILO

Fuerte. Impredecible. Peligroso.

- El fentanilo es un potente opioide sintético de acción rápida, así que las sobredosis ocurren con rapidez.
- No te puedes dar cuenta de que has tomado fentanilo que se añadió a pastillas, cocaína, MDMA o heroína.
- Una pastilla, línea o "toque" puede causar una sobredosis mortal.

APRENDE ACERCA DE LA NALOXONA

Segura. Simple Legal.

- La naloxona es un medicamento que revierte las sobredosis de opioides.
- Cualquier persona puede obtener, portar y usar naloxona – no necesita entrenamiento especial.
- Está disponible de manera gratuita en muchas comunidades, o puedes comprarla en una farmacia.
- Washington tiene una orden permanente que sirve como receta médica, por lo que no se necesita receta.
- No forma hábito y no puede causarle daño a nadie, incluso si no consumió opioides.

TU AMIGO PUEDE TENER UNA SOBREDOSIS SI:

- No puede despertar.
- No está respirando cada 3 a 5 segundos.
- Se está poniendo azul, gris o morado, o su piel se siente fría.

Si crees que tu amigo tiene una sobredosis, llama al 911. Después adminístrale naloxona y respiración de rescate.


El estado de Washington tiene leyes del Buen Samaritano para protegerlos a usted y a su amigo del enjuiciamiento por posesión de drogas.

CÓMO USAR EL AEROSOL NASAL DE NALOXONA

Empieza por acostar a tu amigo.

1. Abre el empaque.

No pruebes el rociador. El cartucho contiene una sola dosis.




2. Sosten el cartucho de esta manera.



3. Inserta la boquilla en cualquiera de las fosas nasales.

Sus dedos deben tocar la nariz.



4. Oprime el émbolo hasta el fondo.

La naloxona comienza a actuar dentro de 2 - 3 minutos.

